

NORMAS DE PREPARACION DE COLON CON MOVIPREP (Cita por la tarde)

- Si está tomando anticoagulantes como Sintrom®, comuníquenoslo, para organizar la colonoscopia de forma adecuada sin tener que suspender por completo la anticoagulación. Si está en tratamiento con Insulina, comuníquenoslo, para poder realizar la exploración a primera hora de la mañana.
- Una semana antes de la colonoscopia debe suspender la toma de preparados de hierro y de antiagregantes (medicamentos utilizados para prevenir la trombosis) tales como Iscover® o Plavix®. Puede continuar tomando ácido acetilsalicílico (Aspirina®, Adiro®, Tromalyt®).
- **LA TARDE ANTES** de la colonoscopia: **LIQUIDOS CLAROS**

LIQUIDOS CLAROS = agua, infusiones, caldos filtrados, café o té, zumos de fruta colados y bebidas refrescantes sin burbujas.

COMO PREPARAR MOVIPREP



MOVIPREP se presenta en 2 sobres de polvo (A y B). Añada el contenido de los dos sobres a una jarra con 1 litro de agua y remuévalo. La preparación resultante posee sabor a cítricos y puede enfriarse en la nevera antes de su uso ya que así resulta es más agradable. La solución preparada se debe conservar a temperatura inferior a 25°C y solo se puede usar en las siguientes 24 horas.

Administración de MOVIPREP

Para una limpieza efectiva del colon se requieren 2 litros de MOVIPREP.

- **A LAS 8 DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA PRUEBA:**
Tome un litro de MOVIPREP a lo largo de 1-2 horas. Para evitar deshidratarse deberá tomar además otro litro de líquidos claros.
- **A LAS 10 DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA PRUEBA:** Tome un litro de MOVIPREP a lo largo de 1-2 horas. Luego tomará otro litro de líquidos claros.
- **No puede tomar nada, ni siquiera agua, a partir de las 12:00 horas.**